

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 29-6-63 212263

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION de la STATION de BORDEAUX (Tél. 92-26-94)

ABONNEMENT ANNUEL
15 NF

(GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&-GARONNE, LANDES,
BASSES-PYRÉNÉES, CHARENTE, CHARENTE-MARITIME)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Chemin d'Artigues, CENON (Gironde)

C. C. P. : BORDEAUX 6707-65

Supplément N° 2 au Bulletin Technique N° 32 de Mai 1963

I963-I4

AVERTISSEMENTS

VIGNE

Black-Rot : Les premières taches de Black-Rot viennent d'apparaître. Pour éviter l'extension des premiers foyers, nous conseillons l'application immédiate d'un nouveau traitement.

Mildiou : L'évolution des oeufs d'hiver a été contrariée par la sécheresse de la fin du mois d'avril et du début de mai. Les risques de contaminations restent donc faibles.

Néanmoins, les pluies actuelles peuvent permettre quelques germinations notamment dans les vignobles bien exposés où la température est plus élevée.

Pour éviter les premières contaminations dans les foyers habituels (bas fonds Iles Atlantiques) un premier traitement pourrait être appliqué dans les parcelles qui, en raison de l'absence du Black-Rot, n'ont pas encore reçu de traitement.

Vers de la grappe : Les basses températures gênent l'évolution des papillons. Malgré cela, les captures se poursuivent et des oeufs (qu'il ne faut pas confondre avec des glandes perlées) ont pu être déposés. Sauf pour le vignoble Charentais où l'évolution est plus tardive, un insecticide pourrait être incorporé à la Bouillie préconisée contre le Black-Rot et le Mildiou.

ARBRES FRUITIERS

Tavelures et Carpocapse : Un traitement mixte devrait être appliqué dès à présent. Si les captures de Carpocapse sont peu importantes, les sorties en cages éclosaires sont nombreuses et malgré le temps frais, des pontes ont pu être déposées.

INFORMATIONS

VIGNE

Acariose : Les dégâts de l'Acariose qui se manifestent par l'apparition de pousses rabougries, en particulier sur de jeunes vignes, sont signalés dans diverses régions.

A défaut du traitement classique de prédébourrement conseillé début avril, on peut utiliser par exemple un Parathion, un insecticide systémique, le Dichlorophenyl trichlorethanol, etc...).

Phylloxera gallicole : Les premières galles viennent d'apparaître. Nous rappelons qu'en complément du lessivage d'hiver, on conseille une spécialité à base de Lindane à 30 Grs de M.A./Hl.

POMME de TERRE

Mildiou et Doryphore : Renouveler, sur les pommes de terre de primeurs et dans les cultures très développées, le traitement conseillé le 13 mai.

Contre le Doryphore, attendre que les larves aient atteint la grosseur d'un grain de blé.

Le Contrôleur chargé des Avertissements

Bordeaux, le 25 Mai 1963

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux

Imprimerie de la Station de Bordeaux, Directeur-Gérant: L. BOUYX

C. ROUSSEL

J. BRUNETEAU

P 100